

環境モニタリング結果の解析について（詳細）

（平成 28 年 5 月 10 日～平成 28 年 5 月 16 日公表分）

平成 28 年 5 月 18 日
原子力規制委員会

『総合モニタリング計画』に基づき、関係機関が実施し、平成 28 年 5 月 10 日～平成 28 年 5 月 16 日に公表されたモニタリングの結果は以下のとおりです。

なお、ここでのモニタリングとは、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故後に、日本の環境中の放射性物質濃度がどのように変化しているかを継続的に測定しているものです。

I. 福島県全域等の環境（陸域、海域）モニタリング結果

1 空間線量率

- 福島県のモニタリングポストによる空間線量率の分布は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所周辺や北西方向の地点において比較的高い線量率を示す箇所が認められるものの、空間線量率の推移は全体的には減少傾向を示しています。（下記参考 URL 参照）

○参考 URL

東京電力福島第一、第二原子力発電所周辺及び福島県のモニタリングポストの測定結果

<http://radioactivity.nsr.go.jp/map/ja/>

以上、空間線量率については、全体的に減少傾向にありますが、前回と比較すると特別の変化はありませんでした。

2 大気中の放射性物質濃度

- 福島県内の大気中からの定時降水に含まれる放射性物質の降下量（福島市方木田：平成 28 年 4 月 27 日～5 月 10 日に採取）の放射性セシウムの最高値（Cs-137）は、7.1Bq/m²でした。（参考資料 1、2 ページ参照）

以上、大気中の放射性物質濃度については、全体的に減少傾向にありますが、前回と比較すると特別の変化はありませんでした。

3 海水・海底土の放射性物質濃度

（1）海水

- 東京電力株式会社福島第一原子力発電所近傍の海水

平成28年5月8日～5月14日に採取した海水に含まれる放射性セシウムは、検出下限値未満(<1Bq/L)でした。(参考資料3～6ページ参照)※1

平成28年4月18日に採取した海水に含まれる放射性セシウムの最高値(Cs-137)は、0.11Bq/Lであり(参考資料8ページ参照)、濃度限度(注1)を下回っていました。※2

平成28年2月8日、3月3日に採取した海水に含まれる放射性セシウム(Cs-137)の最高値は、0.15Bq/Lであり(参考資料15、18ページ参照)、濃度限度(注1)を下回っていました。※3

平成28年5月2日、9日に採取した海水に含まれるH-3の最高値は、6.6Bq/Lであり(参考資料3～6ページ参照)、濃度限度(注1)を下回っていました。※4

平成28年2月8日、3月3日に採取した海水に含まれるH-3は、0.63Bq/Lであり(参考資料15、18ページ参照)、濃度限度(注1)を下回っていました。※3

平成28年4月4日に採取した海水に含まれるSr-90の最高値は、0.057Bq/Lであり(参考資料7ページ参照)、濃度限度(注1)を下回っていました。※4

平成28年1月22日～3月3日に採取した海水に含まれるSr-90の最高値は、0.014Bq/Lであり(参考資料15、18ページ参照)、濃度限度(注1)を下回っていました。※3

平成28年5月8日～5月14日に採取した海水に含まれる全β(蒸発乾固法)の最高値は、15Bq/Lでした。(参考資料3～6ページ参照)※4

平成28年2月8日、3月3日に採取した海水に含まれる全β(鉄バリウム共沈法)の最高値は、0.05Bq/Lでした。(参考資料15、18ページ参照)※3

平成28年4月4日に採取した海水に含まれる全αは、検出下限値未満(<2Bq/L)でした。(参考資料7ページ参照)※4

平成28年1月22日、2月8日に採取した海水中のPu-238は検出下限値未満(<9μBq/L)、Pu-239+240の最高値が11μBq/Lでした。(参考資料15、18ページ参照)※3
- 東京電力株式会社福島第一原子力発電所周辺の海水

平成28年4月12日～19日に採取した海水に含まれる放射性セシウムの最高値(Cs-137)は、0.064Bq/Lでした。(参考資料8ページ参照)※4

平成28年2月8日、3月3日に採取した海水に含まれる放射性セシウム(Cs-137)の最高値は、0.058Bq/Lでした。(参考資料16、18ページ参照)※3

平成28年4月5日に採取した海水に含まれるH-3は、検出下限値未満(<0.4Bq/L)でした。(参考資料7ページ参照)※4

平成28年2月8日、3月3日に採取した海水に含まれるH-3の最高値は、0.76Bq/Lでした。(参考資料16、18ページ参照)※3

平成28年4月5日に採取した海水に含まれるSr-90は、検出下限値未満(<8mBq/L)でした。(参考資料7ページ参照)※4

平成 28 年 1 月 22 日～3 月 3 日に採取した海水に含まれる Sr-90 の最高値は、2mBq/L でした。(参考資料 16、18 ページ参照) ※ 3

平成 28 年 4 月 5 日に採取した海水に含まれる全 β (蒸発乾固法) は、検出下限値未満 (<20Bq/L) でした。(参考資料 7 ページ参照) ※ 4

平成 28 年 2 月 8 日、3 月 3 日に採取した海水に含まれる全 β (鉄バリウム共沈法) の最高値は、0.04Bq/L でした。(参考資料 16、18 ページ参照) ※ 3

平成 28 年 4 月 5 日に採取した海水に含まれる全 α は、検出限界未満 (<2Bq/L) でした。(参考資料 7 ページ参照) ※ 4

平成 28 年 2 月 8 日、3 月 3 日に採取した海水に含まれる Pu-238 及び Pu-239+240 は、検出下限値未満 (Pu-238:<13 μ Bq/L、Pu-239+240:<10 μ Bq/L) でした。(参考資料 16、18 ページ参照) ※ 3

- ・ 福島県沿岸・沖合の海水

平成 28 年 4 月 8 日、12 日に採取した海水に含まれる放射性セシウムの最高値 (Cs-137) は、9.4mBq/L でした。(参考資料 9 ページ参照) ※ 4

- ・ 福島県の港湾・海面漁場の海水

平成 28 年 3 月 1 日～30 日に採取した海水に含まれる放射性セシウムは、検出限界未満 (Cs-134:<約 1Bq/L、Cs-137:<約 1Bq/L) でした。(参考資料 21～32、40、41 ページ参照)

試験操業海域の 6 地点において、平成 28 年 3 月 2 日、4 日に採取した海水に含まれる H-3 は、検出下限値未満 (約<0.4Bq/L)、全 β (鉄バリウム共沈法) の最高値は、0.03Bq/L でした。(参考資料 30～32、40、41 ページ参照) ※ 3

- ・ 宮城県沿岸の海水

平成 28 年 4 月 12 日に採取した海水に含まれる放射性セシウム (Cs-137) の最高値 (Cs-137) は、5.5mBq/L でした。(参考資料 42 ページ参照) ※ 4

- ・ 茨城県沿岸の海水

平成 28 年 4 月 18～20 日に採取した海水に含まれる放射性セシウムは、検出限界値未満 (Cs-134:<2Bq/L、Cs-137:<2Bq/L) でした。(参考資料 43 ページ参照) ※ 4

※ 1 : 東京電力によるモニタリング (Cs 日常分析)、※ 2 : 東京電力によるモニタリング (Cs 詳細分析)、※ 3 : 福島県によるモニタリング、※ 4 : 東京電力によるモニタリング

(2) 海底土

- ・ 東京電力株式会社福島第一原子力発電所近傍の海底土

平成 28 年 2 月 8 日に採取した海底土に含まれる放射性セシウムの最高値 (Cs-137) は、460Bq/kg・乾土でした。(参考資料 17、18 ページ参照) ※

平成 28 年 2 月 8 日に採取した海底土に含まれる Sr-90 の最高値は、0.23Bq/kg・乾土でした。(参考資料 17、18 ページ参照) ※

平成 28 年 2 月 8 日に採取した海底土に含まれる Pu-238 は、検出下限値未満 (<0.01Bq/kg・乾土)、Pu-239+240 の最高値は、0.36Bq/kg・乾土でした。(参考資料 17、18 ページ参照) ※

- 東京電力株式会社福島第一原子力発電所周辺の海底土
平成28年2月8日に採取した海底土に含まれる放射性セシウムの最高値 (Cs-137) は、210Bq/kg・乾土でした。(参考資料17、18ページ参照) ※
平成28年2月8日に採取した海底土に含まれる Sr-90 の最高値は、0.37Bq/kg・乾土でした。(参考資料17、18ページ参照) ※
平成28年2月8日に採取した海底土に含まれる Pu-238 は、検出下限値未満 (<0.01Bq/kg・乾土)、Pu-239+240 の最高値は、0.39Bq/kg・乾土でした。(参考資料17、18ページ参照) ※
- 福島県の港湾・海面漁場の海底土
平成28年3月2日～9日に採取した海底土に含まれる放射性セシウムの最高値 (Cs-137) は、472Bq/kg・乾土でした。(参考資料33～38、40、41ページ参照) ※
※：福島県によるモニタリング

以上、海水の放射性物質濃度については、全体的に減少傾向にありますが、前回と比較すると特別の変化はありませんでした。また、海底土の放射性物質濃度については、特別の変化はありませんでした。

II. 全国のモニタリング結果

1 空間線量率

- 全国の空間線量率については、下記の URL にて測定結果が公表されています。
全国の測定結果
<http://radioactivity.nsr.go.jp/map/ja/>
なお、全国の既設のモニタリングポストの所在地は、下記の URL をご参照ください。
http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/1000/211/0/Location_and_GPS_data_of_monitoring_posts_in_47_prefectures.pdf

空間線量率については、概ね事故以前の水準で推移しており、特別の変化もありませんでした。

III. その他のモニタリング結果

1 東京湾の海水の放射性物質濃度

- 平成28年2月5日に採取した東京湾の海水に含まれる放射性セシウムの最高値 (Cs-137) は、3.6mBq/L でした。(参考資料44、45ページ参照)

2 東京湾の海底土の放射性物質濃度

- 平成28年1月8日～2月5日に採取した東京湾の海底土に含まれる放射性セシウムの最高値 (Cs-137) は、110Bq/kg・乾土でした。(参考資料46～49ページ参照)

ジ参照)

3 食品等のモニタリング結果

下記の URL をご参照ください。

食品中の放射性物質への対応について

http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/shokuhin.html

水産物の放射性物質調査の結果について

<http://www.jfa.maff.go.jp/j/housyanou/kekka.html>

酒類等の放射能分析結果について

<http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/anzen/radioactivity.htm>

水道中の放射性物質濃度について

http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/suidou.html

4. 【参考】：東京電力福島第一原子力発電所の港湾内のモニタリング結果

- 東京電力株式会社福島第一原子力発電所港湾内の海水
平成 28 年 5 月 9 日～5 月 15 日に採取した海水に含まれる放射性セシウムの最高値 (Cs-137) は、16Bq/L でした。
平成 28 年 5 月 9 日～5 月 15 日に採取した海水に含まれる全 β (蒸発乾固法) の最高値は、36Bq/L でした。
平成 28 年 5 月 2 日、9 日に採取した海水に含まれる H-3 の最高値は、25 Bq/L でした。
平成 28 年 4 月 4 日に採取した海水に含まれる Sr-90 は、0.016 Bq/L でした。
平成 28 年 5 月 9 日～5 月 15 日に採取した港湾口付近の海水に含まれる放射性セシウムの最高値 (Cs-137) は、0.63Bq/L でした。
平成 28 年 5 月 9 日～5 月 15 日に採取した港湾口付近の海水に含まれる全 β (蒸発乾固法) の最高値は、17Bq/L でした。
平成 28 年 5 月 2 日に採取した港湾口付近の海水に含まれる H-3 は、検出下限値未満 (<2Bq/L) でした。
平成 28 年 4 月 4 日に採取した港湾口付近の海水に含まれる Sr-90 は、0.016 Bq/L でした。

○参考 URL

<http://www.tepco.co.jp/decommision/planaction/monitoring/index-j.html>

(注 1)

法令に定める周辺監視区域外の水中の放射性物質の濃度限度

I-131: 40Bq/L、Cs-134: 60Bq/L、Cs-137: 90Bq/L、Sr-90: 30Bq/L、H-3: 60,000Bq/L

法令に定める周辺監視区域外の空気中の放射性物質の濃度限度
I-131 : 5Bq/m³、Cs-134 : 20Bq/m³、Cs-137 : 30Bq/m³